

## Lecture 22 Green's Theorem

## Chapter 4 Vector Calculus

<sup>1</sup> ในหัวข้อนี้ เราจะศึกษาทฤษฎีบทที่ช่วยให้การคำนวณปริพันธ์ตามเส้นสวดวงขึ้นโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริพันธ์สองชั้นดังนี้

**ทฤษฎีบท 1** (ทฤษฎีบทของกรีน (Green's Theorem)). ให้  $R$  เป็นบริเวณที่เป็นเซตเชื่อมโยง (simply connected set) ที่มีขอบเขตเป็นเส้นโค้ง  $C$  ที่เป็นเส้นโค้งอย่างง่าย (simple) ปิด (closed) ปรับเรียบเป็นช่วง (piecewise smooth) และมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (counterclockwise) ถ้าฟังก์ชัน  $f(x,y)$  และ  $g(x,y)$  และอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งที่เกี่ยวข้อง เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนบริเวณเปิดที่บรรจุ  $R$  แล้ว ปริพันธ์ตามเส้น

$$\int_C f(x,y)dx + g(x,y)dy = \iint_R \left( \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dA$$

เนื่องจากเส้นโค้ง  $C$  ที่สอดคล้องกับทฤษฎีบทของกรีนต้องเป็นเส้นโค้งปิด เราอาจใช้สัญลักษณ์  $\oint$  แทน  $\int$  เพื่อระบุสมบัติเฉพาะนี้ได้

**ตัวอย่าง 1.** จงประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทของกรีนเพื่อหาค่าของ

$$\oint_C x^2 y dx + x dy$$

โดยที่  $C$  เป็นวิถีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีจุดยอดเป็น  $(0,0)$ ,  $(1,0)$  และ  $(1,2)$  ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

<sup>1</sup>ABD12 : Section 15.4 : 1-2, 3-13, 14, 15-18, 20, 21, 23, 24, 26, 29-30, 31, 32, 33-36

ตัวอย่าง 2. จงประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทของกรีนเพื่อหาค่าของ

$$\oint_C (e^{x^2} - y)dx + (x + \sin \sqrt{y})dy$$

โดยที่  $C$  เป็นวิถีในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาที่ประกอบด้วยเส้นรอบครึ่งวงกลมรัศมี 2 หน่วยเหนือแกน  $x$  และส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุด  $(-2,0)$  กับ  $(2,0)$

ตัวอย่าง 3. จงหางานที่เกิดจากเคลื่อนที่ของอนุภาคจากจุด  $(1, 1)$  ไปยัง  $(4, 2)$  ตามเส้นโค้ง  $y = \sqrt{x}$  จากนั้นเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงไปยังจุด  $(1, 2)$  และเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงกลับมาที่จุด  $(1, 1)$  ในสนามแรง  $\mathbf{F}(x, y) = (y^2 - \sin x)\mathbf{i} + (xy + \ln x)\mathbf{j}$

ในอีกด้านหนึ่ง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทของกรีน เราสามารถใช้ปริพันธ์ตามเส้นคำนวณหาพื้นที่  $A$  ของบริเวณ  $R$  ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในทฤษฎีบทของกรีนได้โดย

$$\begin{aligned} A &= \oint_C x dy \\ &= \oint_C (-y) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_C (-y) dx + x dy \end{aligned}$$

**ตัวอย่าง 4.** จงใช้ปริพันธ์ตามเส้นคำนวณหาพื้นที่ของบริเวณซึ่งปิดล้อมด้วยวงรี

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ตัวอย่าง 5. จงใช้ปริพันธ์ตามเส้นคำนวณหาพื้นที่ของบริเวณซึ่งปิดล้อมด้วยรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีจุดยอดเป็น  $(0,0)$ ,  $(a,0)$  และ  $(0,b)$  โดยที่  $a, b > 0$